



บทความพิเศษ เรื่อง โรคจิตเสื่อมในสุนัข สนับสนุนบทความโดย โรงพยาบาลสัตว์ เอ็น.พี.

โรคจิตเสื่อม (Dementia) หรือโรคสมองเสื่อมในสุนัขสูงอายุ (Senile dysfunction) หรือ การสูญเสียการรับรู้ (Cognitive dysfunction) เป็นภาวะเสื่อมตามปกติในสุนัขสูงวัย ซึ่งพบได้ใน บางราย โดยสรุปโรคนี้เกิดเนื่องจากการรับรู้ของสมองเสื่อมจากอายุ

การวินิจฉัยโรคนี้มักดูจากอาการของพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนไปจากปกติ ซึ่งมีจุดสังเกตได้อย่างน้อย 2 อย่างคือ

สุนัขมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของลดลง เช่น ไม่สนใจที่จะต้อนรับเจ้าของหรือแสดงอาการดีใจเมื่อพบ เจ้าของ

มีอาการคันมากกว่าปกติ เช่น เกาบ่อยๆ เชื่องช้าขึ้น เช่น ตอบสนองต่อคำสั่งช้ากว่าเดิม ช่วงเวลาการหลับและตื่นผิดไปจากปกติ ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เคยเป็น



สุนัขแก่ที่เป็นโรคสมองเสื่อมอาจ เหน็ดเหนื่อยกว่าปกติ เดินไม่มีจุดหมาย นอนทั้งวันไม่สนใจเจ้าของ ปัสสาวะ อุจจาระผิดไปจากปกติ

เจ้าของสุนัขมักพาสุนัขมาด้วยอาการสุนัขไม่ยอมหลับนอน เดินเปะปะตอนกลางคืนหรือเวลาปกติที่เป็นเวลานานอน ไม่สนใจเจ้าของและคำสั่งของเจ้าของ

อาการสมองเสื่อมแบบนี้อาจมีอาการชัก และอาการทางประสาทอย่างอื่นให้เห็นในบางราย พบได้ในสุนัขทุกเพศและพันธุ์ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป อาการจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสาเหตุยังไม่ทราบ

อาการที่แสดงออกอาจรบกวนเจ้าของและเพื่อนบ้าน เช่น เห่าทั้งคืน เดินไม่รู้จุดหมาย ไม่ยินดียินร้ายกับเจ้าของ และปัสสาวะไม่เป็นที่เป็นทาง

นอกจากอายุแล้ว สาเหตุที่ทำให้การรับรู้ทางสมองของสุนัขเสื่อมอาจมาจาก

เนื้องอกของสมองและไขสันหลัง (Tumor of brain and spinal cord)

มีน้ำในสมอง (Hydrocephalus)

เยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningoencephalitis)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรคหัวใจล้มเหลว (Heart failure)

ไตวาย (Kidney failure)

ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ (Urinary infection)

กระดูกสันหลังช่วงเอวอกหรือกดทับเส้นประสาท (Lumbosacral disease)

โรคของต่อมไร้ท่อ (Endocrine dysfunction) เช่น ไทรอยด์ต่ำ หรือ ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตสูงกว่า

ปกติ

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยเพื่อแยกโรคนี้ออกจากโรคทางประสาทอื่น ๆ อาศัย

การตรวจทางระบบประสาท (Neurological examination)

ตรวจนับเม็ดเลือด (CBC)

ตรวจค่าเคมีในเลือด (Blood chemistry)

ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)

เพาะเชื้อจากปัสสาวะ (Urine culture and sensitivity test)

ตรวจการทำงานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine testing) โดยตรวจคอร์ติซอลและไทรอยด์

เจาะน้ำไขสันหลังตรวจ (CSF analysis)

ฉายภาพรังสีช่องอก

การรักษา

การรักษาอาศัย

การรักษาโรคที่เป็นสาเหตุในกรณีนี้ที่ทราบ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเฉพาะตามที่สัตวแพทย์สั่ง
ให้ยาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะกินเวลาอย่างน้อย 2 เดือนจึงจะเห็นผล

การดูแล

ให้ยาตามที่สัตวแพทย์สั่งตามเวลาที่กำหนด สังเกตอาการผิดปกติของสุนัขที่แสดงออกแล้วแจ้งให้
สัตวแพทย์ทราบว่าดีขึ้นหรือแย่ลง

ถ้าสุนัขทุกข์ทรมานจากโรคสมองเสื่อมมาก ต้องระวังไม่ให้สุนัขออกนอกบ้านเพราะจะกลับไม่ถูก ใส่
กระป๋วนหรือกระดิ่งเพื่อให้ทราบว่าสุนัขอยู่ที่ไหน

Dr. John McDonnell